

FLUMEGAM

INJETÁVEL 50 mg

USO VETERINÁRIO - Injetável
FLUNIXINA MEGLUMINA
ANTI-INFLAMATÓRIO,
ANALGÉSICO E ANTIPIRÉTICO



Fórmula:

Flunixinina (Meglumina) 5,0 g*
Excipiente q.s.p. 100,0 mL

* Correspondente a 8,3 g de Flunixinina Meglumina

Descrição:

FLUMEGAM INJETÁVEL 50 mg é um analgésico não narcótico, não esteroide (AINE), com propriedades anti-inflamatórias, atuando por inibição da enzima ciclooxigenase, responsável pela conversão do ácido araquidônico, em prostaglandinas (PG) e tromboxanos (TXOs). FLUMEGAM INJETÁVEL 50 mg atua no SNC aliviando a dor e nas inflamações, possuindo também propriedades antipiréticas.

Indicações:

FLUMEGAM INJETÁVEL 50 mg é indicado para o tratamento das síndromes inflamatórias e/ou dolorosas e dos estados febris em suínos.

Posologia e modo de usar:

Suínos: administrar 2,2 mg de flunixinina meglumina/kg de peso vivo, que corresponde a 2,2 mL de FLUMEGAM INJETÁVEL 50 mg/ 50 kg de peso vivo, pela via intramuscular ou intravenosa, a cada 24 horas, durante 3 a 5 dias.

Contraindicações e limitações de uso:

O uso deste produto deve ser evitado quando já estiver sendo utilizada outras drogas anti-inflamatórias não esteróides, glicocorticóides ou diuréticos;

Não usar medicamentos em animais em período de gestação;

Não administrar associado a anestésicos à base de metoxilfurano;

Não administrar em animais com histórico de hipersensibilidade;

Não administrar pela via intra-arterial, pois pode causar estimulação do SNC como histeria, ataxia, hiperventilação e fraqueza muscular;

Administrar com cautela em animais com úlceras gastrointestinais pré-existent, doenças renais, hepáticas ou hematológicas;

Precauções gerais:

- Ler a bula atentamente antes de usar o produto;

- Recomenda-se não exceder a dose recomendada em bula;

- Não fumar ou alimentar-se durante o manuseio do produto;
- Lavar sempre as mãos após o manuseio de qualquer produto veterinário;
- Não guardar perto de alimentos, bebidas, outros medicamentos, produtos de higiene pessoal ou doméstica;
- Caso ocorram eventos adversos persistentes ou de maior intensidade, o veterinário deverá ser consultado;
- Pessoas com hipersensibilidade conhecida aos componentes ativos da fórmula devem evitar o contato com o produto veterinário;
- Evitar o contato com a pele, com o uso de luvas ao manipular o produto. Em caso de contato acidental com o produto, lavar abundantemente com água corrente. Em caso de ingestão acidental, não induzir vômito e consultar o médico levando consigo a bula do produto;
- Não utilizar o produto com o prazo de validade vencido;
- Não reutilizar as embalagens vazias e descartá-las conforme legislação vigente, para evitar a contaminação do meio ambiente.

Período de carência:

ATENÇÃO: OBEDECER AOS SEGUINTES PERÍODOS DE CARÊNCIA
SUÍNOS: ABATE: O ABATE DOS ANIMAIS TRATADOS COM ESTE PRODUTO SOMENTE DEVE SER REALIZADO 07 DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO.

A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS INDICADAS NESTA BULA PODE CAUSAR A PRESENÇA DE RESÍDUOS DO PRODUTO ACIMA DOS LIMITES APROVADOS, TORNANDO O ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO.

Mantenha este, ou qualquer outro medicamento, fora do alcance de crianças e animais domésticos. Conservar o produto ao abrigo da luz solar e à temperatura ambiente, entre 15 °C e 30 °C.

VENDA SOB PRESCRIÇÃO E APLICAÇÃO SOB ORIENTAÇÃO DO MÉDICO-VETERINÁRIO.

Licenciado pelo MAPA desde 13/03/2001.
Registrado sob o número SP 000130-0.000005.

Proprietário:

Ceva Saúde Animal Ltda.

Uma empresa do grupo Ceva Santé Animale
R. Doutor Elton César, nº 123 – Anexo 121, Chácaras Campos dos Amarais

CEP: 13082-025 – Campinas/SP

CNPJ: 07.086.487/0011-98

Responsável Técnico: Dra. Janaina Carlstron - CRMV-SP 21.555

Fabricante:

Sespo Indústria e Comércio Ltda.

Rua Manoel Joaquim Filho, 303

CEP: 13148-115 – Paulínia/SP

CNPJ: 50.464.692/0001-05

