

# THIAMVET 50% PS

Antimicrobiano à base de tianfenicol  
para uso oral em suínos


**USO VETERINÁRIO**

**ATENÇÃO: OBEDECER AOS SEGUINTE PERÍODOS DE CARÊNCIA  
SUÍNOS:**

**ABATE: O ABATE DOS ANIMAIS TRATADOS COM ESTE PRODUTO SOMENTE DEVE  
SER REALIZADO 5 DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO.**

**A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS INDICADAS NESTA  
BULA PODE CAUSAR A PRESENÇA DE RESÍDUOS ACIMA DOS LIMITES  
APROVADOS, TORNANDO O ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL IMPRÓPRIO PARA O  
CONSUMO.**

Conteúdo:  
**250 g**



**FÓRMULA:** Cada 100 g do produto contém:

Tianfenicol ..... 50,00 g  
Excipientes q.s.p. .... 100,00 g

**DESCRIÇÃO:** **THIAMVET 50% PS** é um antibiótico à base de tianfenicol apresentado na forma de pó solúvel. O tianfenicol é um antimicrobiano de rápida absorção quando administrado por via oral em suínos.

**INDICAÇÕES:** **THIAMVET 50% PS** é indicado para o tratamento de infecções bacterianas em suínos causadas por *Actinobacillus pleuropneumoniae*, *Actinobacillus suis*, *Haemophilus parasuis*, *Streptococcus suis*, *Erysipelothrix rhusiopathiae* e *Staphylococcus aureus*.

**FARMACODINÂMICA E FARMACOCINÉTICA:** o tianfenicol é um fármaco da classe dos anfenicóis considerado um análogo semissintético do cloranfenicol. Sua principal ação é bacteriostática podendo também ter efeito bactericida dependendo do tipo de bactéria e do local da infecção. Seu mecanismo de ação se dá por inibição da síntese proteica bacteriana.

Do ponto de vista farmacocinético, a absorção do tianfenicol em suínos pela via oral é rápida. Em estudo realizado com **THIAMVET 50% PS**, a concentração plasmática deste fármaco elevou-se rapidamente atingindo o pico em aproximadamente ( $T_{max}$ ) 2,35 horas após o tratamento e atingiu ( $C_{max}$ ) 1,25µg/mL. O tempo de meia vida aparente para a dose empregada foi de 2,32 horas e a área sob a curva de 6,6µg\*h/mL. Assim, pode-se dizer que a administração de tianfenicol através da água de bebida provoca rápido aumento de seu nível plasmático, que se mantém estável durante todo o tratamento e, por fim, ocorre rápida eliminação ao final do mesmo.

Com relação a sua excreção, geralmente ocorre pelos rins na urina, após filtração glomerular, mas também pode ser eliminado através da bile e das fezes.

#### **POSOLOGIA E MODO DE USO:**

**Posologia:** 10 mg/kg de peso vivo de tianfenicol que corresponde à 20 mg de **THIAMVET 50% PS**.

**Modo de Uso:** **THIAMVET 50% PS** deverá ser dissolvido em água de bebida, de acordo com a dose recomendada e administrado pela via oral durante 7 dias consecutivos.

#### **CONTRAINDICAÇÕES E LIMITAÇÕES DE USO:**

**Contraindicações:** não utilizar o produto em animais com hipersensibilidade ao(s) componente(s) da formulação. Não utilizar o produto em animais com insuficiência renal. Não utilizar o produto com prazo de validade vencido. Estudo clínico conduzido com suínos mostraram que o produto é seguro quando utilizado de acordo com as recomendações do fabricante. A segurança do produto não foi avaliada em fêmeas prenhes e animais em reprodução.

**INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS:** não administrar o produto em animais que estejam em tratamento com anticoagulantes cumarínicos (dicumarol, varfarina sódica), certos hipolipemiantes orais (tolbutamida, clorpropamida) e, de anticonvulsivantes (fenitoína). Também pode diminuir os efeitos do ferro e da vitamina B12 em pacientes anêmicos e do acetaminofeno (paracetamol). A metabolização da ciclofosfamida pode ser diminuída com o uso simultâneo do tianfenicol.

**REAÇÕES ADVERSAS:** o produto quando utilizado nas dosagens indicadas não provoca reações adversas. A administração de doses elevadas pode causar distúrbios gastrointestinais tais como náusea, vômito e diarreia. Caso detecte algum efeito colateral grave ou outros efeitos não mencionados nesta bula, informe imediatamente ao médico-veterinário.

**PRECAUÇÕES GERAIS:** obedecer às dosagens e recomendações para uso do produto. Manter a embalagem fechada. Não utilizar em outras espécies animais. Não fumar ou alimentar-se durante o manuseio do produto. Usar luvas de proteção e lavar as mãos após o manuseio do produto. Em caso de contato com pele ou olhos, lavar imediatamente com água em abundância. Em caso de ingestão acidental, procurar auxílio médico imediatamente. Não armazenar perto de alimentos, bebidas, outros medicamentos e produtos de higiene pessoal ou domésticos. Não reutilizar as embalagens vazias e descartá-las conforme legislação vigente, para evitar a contaminação do meio ambiente.

**APRESENTAÇÃO:** caixa de 5 kg fracionada em 20 sachês de 250 g cada um.

**PRAZO DE VALIDADE:** prazo de validade do produto fechado: 2 (dois) anos após a data de fabricação do produto. Após a abertura da embalagem, todo o conteúdo deve ser utilizado. Utilizar toda a solução de **THIAMVET 50% PS** diluído em água de bebida em até 48 horas.

#### **VENDA SOB PRESCRIÇÃO E ADMINISTRAÇÃO SOB ORIENTAÇÃO DO MÉDICO-VETERINÁRIO.**

Conservar em local seco, ao abrigo da luz solar e à temperatura entre 15 °C e 30 °C.

Manter fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Licenciado pelo MAPA desde 17/01/1996. Registrado sob o número SP 000130- 0.000003.

**Responsável Técnico:** Dra. Janaina Carlstron - CRMV-SP nº 21.555.

**Proprietário:** Ceva Saúde Animal Ltda.

Uma empresa do grupo Ceva Santé Animale

Rua Dr. Elton César, 123 - Anexo 121, Chácara Campos dos Amarais – Campinas/SP CEP: 13082-025 – CNPJ: 07.086.487/0011-98

#### **Fabricantes:**

**VANSIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.**

Rua João Augusto Cirelli, nº 640 - Distrito Industrial - Descalvado/SP - CEP: 13690-000 - CNPJ: 50.472.547/0001-68

**SAN GROUP BIOTECH BRASIL LTDA.**

Estrada Municipal CAM 465, nº 1701 - Campo Grande - Campinas/SP - CEP: 13058-009 - CNPJ: 68.065.663/0001-28

**CEVA SAC:**  
0800-770-0355  
sac@ceva.com

P11049 V03



PART.:

FABR.:

VENC.: