

Dopalen injetável

USO VETERINÁRIO

ANESTÉSICO GERAL INJETÁVEL A BASE DE
KETAMINA PARA USO EM CÃES E GATOS

FÓRMULA - Cada 100 mL contém:

Ketamina (equivalente a 10 g de ketamina base) 11,6 g
Excipientes q.s.p. 100,0 mL

INDICAÇÕES:

DOPALEN é indicado para a anestesia e contenção de cães e gatos.

POSOLOGIA E VIA DE APLICAÇÃO:

DOPALEN deve ser administrado, de acordo com o quadro abaixo:

ESPÉCIE	Dose / kg de peso vivo	mg de ketamina por kg de peso	via de aplicação
Gatos	0,1 mL/kg	10 mg/kg	Intramuscular
	0,06 mL/kg	6 mg/kg	Intravenosa
Cães	0,06 mL/kg	6 mg/kg	Intravenosa
			Intramuscular

OBSERVAÇÕES GERAIS:

A ketamina pode produzir vômitos após sua administração. Para evitar a possível aspiração do vômito, a ketamina deve ser administrada no animal com estômago vazio. Antes da indução da anestesia, recomenda-se administrar atropina, escopolamina ou outro dessecante, uma vez que a ketamina pode aumentar as secreções das glândulas mucosas traqueo-bronquiais e salivares.

A administração da ketamina, em sobredosagem ou aplicada muito rapidamente, pode produzir depressão respiratória, apneia e hipertensão. A administração intravenosa deve ser realizada em um período de 1 minuto, a menos que se utilize uma técnica de indução de sequência rápida. Durante a recuperação, pode-se produzir um estado de convulsão. A administração prévia ou simultânea da ketamina com um benzodiazepínico pode diminuir a incidência de delírio.

ADVERTÊNCIAS:

- Não utilizar em animais com insuficiência cardíaca hipertrofica e hipertensão ou aneurisma arterial;
- Não é indicado o uso em animais com epilepsia, traumatismo craniano, glaucoma e em cirurgias oftalmológicas;
- Outras contraindicações incluem procedimentos em faringe, laringe ou traqueia;
- A administração não é indicada em animais que tenham apresentado reações de hipersensibilidade à ketamina;
- Para a realização de cirurgias eletivas, é recomendado jejum alimentar de 6 horas;
- Durante o período de recuperação anestésica, deixar o animal em local tranquilo, sem barulhos e monitorar as funções vitais do animal frequentemente;
- Estar atento para a possibilidade de hemorragia pós-operatória devido ao aumento da pressão sanguínea;
- Caso detecte algum efeito colateral grave ou outros efeitos não mencionados nesta bula, informe imediatamente ao médico-veterinário;
- A segurança do produto não foi avaliada em fêmeas prenhes/lactantes e em felinos e caninos abaixo de 12 meses.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS:

As seguintes interações medicamentosas da ketamina com outros medicamentos foram relacionadas em função de sua possível importância clínica. Associações que contenham quaisquer dos seguintes medicamentos, dependendo das quantidades presentes, poderão interrelacionar-se com a ketamina:

- Anestésicos orgânicos hidrocarbonados por inalação, tais como: enflurano, halotano, isoflurano e metoxiflurano, já que os anestésicos halogenados por inalação podem prolongar a vida média de eliminação da ketamina.
- Antihipertensivos: medicamentos que produzem depressão do SNC, incluindo aqueles que se utilizam, comumente, como medicação pré-anestésica ou para indução, suplementação ou manutenção da anestesia. O seu uso simultâneo com ketamina, especialmente se administrado em doses elevadas ou de forma muito rápida, pode aumentar o risco de hipotensão e/ou depressão respiratória.
- Hormônios tireóideos: deve-se administrar a ketamina com precaução em animais que recebem hormônios tireóideos, devido ao risco de hipertensão e taquicardia.
- Interferência no diagnóstico: o uso da ketamina pode interferir nos parâmetros fisiológicos do animal, como,

por exemplo, causar um aumento da pressão do líquido cefalorraquidiano (LCR) e da pressão intraocular.

- Problemas clínicos: a ketamina não deve ser usada em qualquer situação em que uma elevação significativa da pressão arterial seja considerada perigosa, como por exemplo enfermidade cardiovascular severa, insuficiência cardíaca, hipertensão severa ou não controlada, histórico de trauma cerebral.

- A relação risco-benefício deve ser avaliada nas seguintes condições: descompensação cardíaca, lesão ocular, globo ocular aberto, hipertensão leve não complicada, aumento da pressão do líquido cefalorraquidiano (LCR), aumento da pressão intraocular, estados tiratóxicos (a ketamina aumenta o risco de hipertensão e taquicardia). É muito importante a monitoração da função cardíaca, principalmente em animais com cardiopatias ou descompensações cardíacas.

EFEITOS ADVERSOS:

Durante o uso da ketamina, alguns efeitos adversos ou secundários podem ocorrer e deverão ser levados em consideração, em função da real importância clínica. Dentre eles, requerem atenção do médico-veterinário: aumento da pressão arterial, hipotensão, bradicardia, dispneia, vômitos depois da administração e movimentos musculares não controlados.

TRATAMENTO DOS EFEITOS ADVERSOS:

- Para a depressão respiratória ou apneia realizar a respiração mecânica assistida.

PRECAUÇÕES GERAIS:

- Obedecer às dosagens e recomendações para uso do produto.
- Não fumar ou alimentar-se durante o manuseio do produto.
- Usar luvas de proteção durante a manipulação do produto.
- Lavar as mãos após o manuseio do produto.
- Em caso de contato com pele ou olhos, lavar imediatamente com água.
- Em caso de autoinjeção acidental, procure auxílio médico imediatamente.
- Não utilizar nem guardar perto de bebidas, alimentos, medicamentos e produtos de higiene doméstica.
- Destinar as embalagens vazias conforme legislação vigente.

APRESENTAÇÃO:

Frasco de vidro contendo 10 mL ou 50 mL.

PRAZO DE VALIDADE:

Dois anos após a data de fabricação. Após aberto, utilizar todo o conteúdo em até 6 meses.

ATENÇÃO: O USO PELO HOMEM PODE CAUSAR GRAVES RISCOS À SAÚDE.

VENDA SOB PRESCRIÇÃO DO MÉDICO-VETERINÁRIO, COM RETENÇÃO OBRIGATÓRIA DA NOTIFICAÇÃO DE RECEITA.

MANTENHA ESTE, OU QUALQUER OUTRO MEDICAMENTO, FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS.

CONSERVAR O PRODUTO AO ABRIGO DA LUZ SOLAR E À TEMPERATURA AMBIENTE, ENTRE 15 °C E 30 °C.

Registrado no MAPA desde 09/12/1996. Registrado sob o número SP 000129-0.000009.

Responsável Técnico: Dr. Cassio R. Murin - CRMV-SP n.º 6473.

Proprietário e Fabricante: Sespo Indústria e Comércio Ltda.

Uma empresa do grupo Ceva Santé Animale Ltda.
Rua Manoel Joaquim Filho, 303
CEP: 13148-115 – Paulínia/SP
CNPJ: 50.464.692/0001-05

