



USO VETERINÁRIO

COMPOSIÇÃO

Cada dose (1 mL) contém:

Antígeno Stx2e modificado $\geq 3,2 \times 10^6$ EU/mL

INDICAÇÃO

A vacina é indicada para a imunização ativa de leitões a partir dos 4 dias de idade, para reduzir a mortalidade, sinais clínicos e efeitos negativos no crescimento devido à doença de edema causada por Stx2e produzida por cepas de *E. coli* (STEC).

Início da imunidade: 3 semanas após a vacinação

Duração da imunidade: 15 semanas após a vacinação

ADMINISTRAÇÃO E DOSAGEM

Antes da administração, agite o frasco da vacina com cuidado.

Aplicar uma única dose (1 mL), pela via intramuscular, em leitões a partir dos 4 dias de idade.

O músculo do pescoço atrás da orelha é o local de aplicação recomendado.

Recomenda-se o uso de uma agulha apropriada para a idade dos leitões (tamanho recomendado 21G, comprimento 16 mm).

REAÇÕES ADVERSAS

Podem ser comumente observadas reações locais muito pequenas, como edema leve no local da aplicação. Essas reações são transitórias e desaparecem em pouco tempo sem tratamento. Ocasionalmente, sinais clínicos como distúrbios comportamentais leves temporários podem ser observados após a aplicação de Ecoporc SHIGA.

Após a aplicação, um leve aumento transitório da temperatura é comum, que diminui em pouco tempo sem tratamento.

PRECAUÇÕES

Mantenha fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Vacinar apenas animais saudáveis.

Use equipamento estéril para produtos injetáveis, respeite as condições assépticas.

Em caso de auto injeção ou ingestão acidental, procure orientação médica imediatamente e apresente a bula do produto ao médico.

A administração simultânea de dextrano de ferro aplicada em diferentes locais não afeta a segurança e a eficácia da vacina.

Não existe informação disponível sobre a segurança e eficácia desta vacina quando utilizada com qualquer outro medicamento veterinário. Portanto, a decisão sobre o uso desta vacina antes ou depois de qualquer outro medicamento veterinário é de responsabilidade do médico veterinário.

Não misture com qualquer outro medicamento veterinário.

Após a abertura do frasco, a vacina deve ser utilizada em até 24 horas.

Restos de produto devem ser descartados conforme legislação vigente.

PERÍODO DE CARÊNCIA

Zero dias.

APRESENTAÇÕES

A vacina é comercializada nas apresentações de 50 mL (50 doses) e 100 mL (100 doses).



ARMAZENAMENTO

Armazenar entre 2°C a 8°C. NÃO CONGELAR.

Manter fora do alcance de crianças e animais domésticos.

VENDA SOB PRESCRIÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO.

Licenciado no MAPA sob nº 10.348/2020 em 12/08/2020.

Responsável Técnica: Laura Lorenzetti Jorge – CRMV/SP 29.505.

PRODUTO IMPORTADO

Proprietário: Ceva Santé Animale.

10 avenue de la Ballastière, 33500, Libourne, France

Fabricante: IDT Biologika GmbH.

Am Pharmapark

06861 Dessau-Rosslau Germany

Representante exclusivo no Brasil, importador e distribuidor:

CEVA SAÚDE ANIMAL LTDA.

Rua Manoel Joaquim Filho, 303 – Santa Terezinha

Paulínia/SP - CEP 13.148-115

CNPJ: 03.224.570/0001-53

