



USO VETERINÁRIO

VERMÍFUGO E GIARDICIDA ORAL PARA CÃES COM PALATABILIZANTE

FÓRMULA

Cada comprimido contém:

Pamoato de Pirantel (equivalente a 50 mg de Pirantel base)	144,00 mg
Praziquantel	50,00 mg
Febantel	150,00 mg
Excipiente q.s.p.	900,00 mg

INTRODUÇÃO

CANEX GIÁRDIA é um vermífugo oral com palatabilizante para uso em cães, utilizando uma associação composta de pamoato de pirantel, febantel e praziquantel, princípios ativos estes com diferentes mecanismos de ação, eficazes para tratamento anti-helmíntico de infecções causadas por nematódeos e cestódeos que acometem os cães e no tratamento da infecção pelo protozoário *Giardia spp.* O pamoato de pirantel é uma tetraidropirimidina que atua inibindo o sistema colinérgico dos nematódeos em nível ganglionar, utilizada no controle de estágios adultos e imaturos de nematódeos gastrointestinais. O praziquantel é uma pirazinoquinolona que atua alterando o fluxo de íons cálcio das membranas celulares, provocando a vacuolização e desintegração do tegumento do helminto e inibindo a captação de glicose de trematódeos interferindo no seu metabolismo energético, matando-o por inanição. São princípios ativos de eleição no tratamento de infestações por cestódeos. O febantel é um pró-benzimidazol, uma molécula que após absorvida é metabolizada em benzimidazol e atua

interferindo no metabolismo energético do parasito, inibindo a absorção e o metabolismo da glicose, resultando no esgotamento da reserva energética e morte dos nematódeos gastrointestinais e pulmonares por inanição.

INDICAÇÃO

CANEX GIÁRDIA é um vermífugo composto pela associação de pirantel, febantel e praziquantel indicado para o tratamento anti-helmíntico de infecções causadas por nematódeos e cestódeos que acometem os cães e no tratamento da infecção pelo protozoário *Giardia spp.*

Nematódeos:

Ancylostoma spp.

Toxocara spp.

Trichuris vulpis

Cestódeos:

Dipylidium caninum

Echinococcus granulosus

Protozoários:

Giardia spp.

POSOLOGIA E MODO DE USAR

Posologia:

A posologia corresponde a 1 (um) comprimido para cada 10 kg de peso corporal obtendo-se a administração aproximada de 14,4 mg de Pamoato de Pirantel, 15 mg de Febantel e 5 mg de Praziquantel por kg de peso corporal conforme tabela a seguir:

Peso do animal	Dosagem
Até 5 kg	½ comprimido
Acima de 5,1 a 10kg	1 comprimido
Acima de 10,1 a 15 kg	1 e ½ comprimido
Acima de 15,1 a 20 kg	2 comprimidos
Acima de 20 kg	Proporcional conforme as dosagens descritas acima

Modo de Usar:

CANEX GIÁRDIA deve ser administrado diretamente por via oral. CANEX GIÁRDIA possui em sua formulação um palatabilizante com intuito de tornar o tratamento mais prático e fácil. Não há necessidade de jejum prévio e/ou qualquer alteração na dieta do cão para a administração do produto.

INTERVALOS ENTRE AS APLICAÇÕES

Para o tratamento de infecções causadas por nematódeos e

cestódeos que acometem os cães o produto CANEX GIÁRDIA deve ser administrado em dose única.

Para o tratamento da infecção pelo protozoário *Giardia spp.*, CANEX GIÁRDIA deve ser administrado ao animal por três dias consecutivos.

CONTRAINDICAÇÕES E LIMITAÇÕES DE USO

- A segurança deste produto não foi determinada em animais com idade inferior a 2 anos de vida e em fêmeas prenhes e lactantes.
- Não administrar o produto a animais com hipersensibilidade aos componentes da fórmula.
- Não utilizar o produto fora das indicações de bula.

POSSÍVEIS EFEITOS COLATERAIS E ANTAGONISMOS FARMACOLÓGICOS

Possíveis efeitos colaterais:

Podem ser observados efeitos colaterais em baixa frequência como; anorexia, vômito, diarreia e letargia. Reações de hipersensibilidade secundárias à liberação de antígenos dos parasitos afetados podem ocorrer, particularmente em altas doses.

Possíveis antagonismos farmacológicos:

Podem ocorrer efeitos sinérgicos entre o praziquantel e oxamiquina, contudo os efeitos clínicos dessa interação ainda não são claros.

O pamoato de pirantel não deve ser administrado concomitantemente ao morantel ou levamisole devido ao seu modo de ação e toxicidade similares. A observação de efeitos colaterais pode ser intensificada em casos de associações com organofosforados ou dietilcarbamazina.

O uso concomitante de piperazina e do pirantel deve ser evitado devido ao seu modo de ação antagônico.

PRECAUÇÕES GERAIS

- Obedecer às dosagens e recomendações para uso do produto.
- Não fumar ou alimentar-se durante o manuseio do produto.
- A higiene é fundamental. Lavar sempre as mãos após o manuseio de qualquer produto veterinário.
- Não guardar o produto perto de alimentos, bebidas, outros medicamentos, produtos de higiene pessoal ou doméstica.
- Conservar o produto em local fresco, seco e protegido da luz solar.
- Caso ocorram sinais adversos persistentes ou de maior intensidade, o veterinário deverá ser imediatamente consultado.

APRESENTAÇÃO

CANEX GIÁRDIA é apresentado sob a forma de comprimidos de 900 mg com palatilizante devidamente acondicionado em

blísteres contendo 4 comprimidos, acompanhados de cartucho e bula.

PRAZO DE VALIDADE

03 anos após a data de fabricação.

MANTENHA ESTE, OU QUALQUER OUTRO MEDICAMENTO, FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS. CONSERVAR O PRODUTO AO ABRIGO DA LUZ SOLAR E À TEMPERATURA AMBIENTE ENTRE 15 °C E 30 °C.

VENDA SOB PRESCRIÇÃO DO MÉDICO-VETERINÁRIO.

Licenciado pelo MAPA desde 09/02/1999. Registrado sob o número SP 000129-0.000017.

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Dra. Janaina Carlstron - CRMV-SP n.º 21.555.

PROPRIETÁRIO E FABRICANTE:

Sespo Indústria e Comércio Ltda.
Uma empresa do grupo Ceva Santé Animale.
Rua Manoel Joaquim Filho, 303
CEP: 13148-115 – Paulínia/SP
CNPJ: 50.464.692/0001-05



0800-770-0355

sac@ceva.com

