

ENROPET



USO VETERINÁRIO
PALATÁVEL
ANTIMICROBIANO ORAL
DE AMPLO ESPECTRO

FÓRMULA

Cada comprimido de 50 mg contém:

Enrofloxacin (cloridrato)	50,0 mg
Excipiente	150,0 mg

Cada comprimido de 150 mg contém:

Enrofloxacin (cloridrato)	150,0 mg
Excipiente	450,0 mg

INDICAÇÕES

ENROPET está indicado no tratamento de infecções em cães e gatos causadas por bactérias gram-positivas e gram-negativas, espiroquetas e micoplasmas.

ENROPET é eficaz no tratamento das:

- Enterites (agudas, subagudas e crônicas), gastroenterites, diarreias e demais afecções do trato digestório de etiologia infecciosa, causadas por: *Escherichia coli*, *Salmonella* spp. e *Treponema* sp.
- Infecções do trato respiratório, tais como: pneumonias, broncopneumonias e bronquites (agudas, subagudas e crônicas), causadas por: *Bordetella bronchiseptica*,

Escherichia coli, *Pasteurella* spp., *Streptococcus* spp., *Staphylococcus* spp., *Pseudomonas* spp., *Klebsiella* spp. e *Mycoplasma* spp.

- Infecções do aparelho geniturinário, tais como: nefrite, pielonefrite, cistite, orquite e prostatite, causadas por *Escherichia coli*, *Staphylococcus* spp., *Streptococcus* spp., *Pseudomonas* spp., *Enterobacter* spp., *Proteus* spp., *Klebsiella* spp., *Brucella* spp. e *Mycoplasma* spp.
- Otites causadas por: *Staphylococcus* spp., *Streptococcus* spp., *Pseudomonas* spp. e *Proteus* spp.
- Infecções dérmicas, tais como piodermites, causadas por: *Staphylococcus aureus*, *Staphylococcus epidermidis*, *Staphylococcus intermedius*, *Escherichia coli*, *Pseudomonas* spp. e *Proteus mirabilis*.
- Outras infecções causadas por microrganismos sensíveis à enrofloxacin, tais como: tonsilite, onfaloflebite, osteomielite e endocardite estafilocócica, desde que o tratamento seja acompanhado por um médico-veterinário e que a prescrição seja validada por um teste de sensibilidade bacteriana.

VIA DE ADMINISTRAÇÃO E MODO DE USAR

ENROPET deve ser administrado diretamente por via oral, podendo ser misturado à ração, carne ou qualquer outro alimento. **ENROPET** possui em sua formulação um palatilizante com o intuito de tornar o tratamento mais prático, ocorrendo de maneira mais natural possível, sem comprometer a rotina do animal, não havendo necessidade de jejum prévio e/ou qualquer alteração na dieta.

POSOLOGIA

A dosagem terapêutica da enrofloxacin para cães e gatos é de 5 mg por kg de peso corporal, equivalente a 1 (um) comprimido de **ENROPET** de 50 mg para cada 10 kg de peso corporal ou 1 (um) comprimido de **ENROPET** de 150 mg para cada 30 kg de peso corporal, uma vez ao dia, durante cinco

dias consecutivos.

Em casos de infecções crônicas ou persistentes e, sempre a critério do médico-veterinário, o tratamento poderá se estender por até 10 dias consecutivos. Animais com peso inferior a 5 kg, administrar ½ (meio) comprimido de 50 mg.

CONTRAINDICAÇÕES, EFEITOS COLATERAIS E PRECAUÇÕES

Em testes clínicos de campo realizados com o produto, não foram observados problemas de locomoção nem lesões nas articulações em nenhum dos animais tratados, independentemente da espécie ou raça. No entanto, de acordo com estudos toxicológicos, a enrofloxacin é contraindicada em cães na fase de crescimento rápido (de 2 a 8 meses) devido a relatos de lesões na cartilagem articular nesta faixa etária. Nas raças gigantes, este período poderá estender-se até os 18 meses. Não se recomenda seu uso em gatos com idade inferior a 2 meses. Pode ocorrer urticária ou prurido em animais hipersensíveis às quinolonas. Deve ser usado criteriosamente e com acompanhamento constante em pacientes com insuficiência renal.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS

Deve ser evitada a associação de qualquer quinolona com complexos vitamínicos ou soluções que contenham ferro, zinco, magnésio, cálcio e cobre, já que estes compostos reduzem a sua absorção. Apresenta antagonismo quando associado com cloranfenicol, rifampicina, tetraciclina e sulfas+trimetopim.

APRESENTAÇÕES

Cartucho contendo 1 blíster com 10 comprimidos de 50 mg e cartucho contendo 1 blíster com 10 comprimidos de 150 mg, de acordo com a apresentação.

Proibida a venda fracionada do produto.

MANTENHA ESTE, OU QUALQUER OUTRO MEDICAMENTO, FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS.

CONSERVAR O PRODUTO AO ABRIGO DA LUZ SOLAR E À TEMPERATURA AMBIENTE, ENTRE 15 °C E 30 °C.

VENDA SOB PRESCRIÇÃO E APLICAÇÃO SOB ORIENTAÇÃO DO MÉDICO-VETERINÁRIO.

PRAZO DE VALIDADE

02 (dois) anos após a data de fabricação.

Licenciado pelo MAPA desde 15/06/1999.

Registrado sob o número SP 000129-0.000031

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Dra. Janaina Carlstron - CRMV-SP nº 21.555.

PROPRIETÁRIO E FABRICANTE

Sespo Indústria e Comércio Ltda.

Uma empresa do grupo Ceva Santé Animale

Rua Manoel Joaquim Filho, 303 - Paulínia/SP

CEP: 13148-115 — CNPJ: 50.464.692/0001-05

 **CEVA SAC**

0800-770-0355

sac@ceva.com

